



Vaginální  
globule  
s kyselinou  
hyaluronovou  
a propolisem

## PŘÍBALOVÝ LETÁK

### 1. Popis výrobku

Apivaginal s kyselinou hyaluronovou a propolisem je zdravotnický prostředek ve formě vaginálních globulí.

**1 globule obsahuje:** 13 mg kyseliny hyaluronové v podobě sodné soli (*sodium hyaluronate*) a 65 mg propolisu v podobě etanolového extraktu propolisu (*ethanolic extract of propolis*).

Po zavedení globule do pochvy dochází k jejímu rozpouštění, v důsledku toho vzniká gel, který má ochranný a hydratační účinek.

---

### 2. Přehled složek

Sodná sůl kyseliny hyaluronové, etanolový extrakt propolisu, polyoxyethylenglykol.

---

### 3. Popis účinku

Globule po rozpuštění v pochvě vytváří viskózní hydrogel, který pokrývá sliznice. Kyselina hyaluronová se váže na sekret sliznic pochvy a vytváří na jejich povrchu gelový povlak. Tato vrstva:

- má hydratační účinek;
- podporuje návrat výstelky pochvy do fyziologického stavu;
- má ochranný účinek a chrání sliznice proti podráždění;
- vytváří podmínky přispívající k aktivaci přirozených regeneračních mechanismů.

---

### 4. Určení

Zdravotnický prostředek je určen k:

- zmírnění obtíží v oblasti stydlkých pysků a pochvy, jako: suchost, svědění, podráždění, pálení, zarudnutí;
- použití po gynekologických zákrocích a operacích.

---

### 5. Způsob použití

Používejte jednu globuli denně, na noc, po dobu 5 dní až do doby odeznění obtíží v pochvě nebo intimní oblasti.

Vyjmout globule z obalu:

- odtrhněte jednu globuli v místě perforace obalu;
- oddělte od sebe obě části fólie a opatrně rozevírejte směrem od sebe;
- vyjměte globuli a ihned ji zaveděte do pochvy.

Vhodnou polohou pro zavedení globule je poloha vleže na zádech, s mírně pokrčenými koleny.



## 6. Upozornění

Během léčby vaginálními globulemi se vyhněte pohlavnímu styku. Použití globulí je nutné naplánovat tak, aby nebylo přerušeno menstruací.

U těhotných a kojících žen je nutné použití globulí konzultovat s lékařem.

Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoliv složku výrobku.

Pokud po použití výrobku dojde ke zhoršení příznaků nebo se objeví vyrážka, otok nebo jiné, dříve nepocitované obtíže v intimní oblasti, přerušte jeho používání a vyhledejte lékaře.

Pokud po použití výrobku dojde ke zmírnění příznaků, ale po 5 dnech se příznaky objeví znova, nepoužívejte výrobek opakováně, ale vyhledejte lékaře.

Nepoužívejte současně s jinými výrobky určenými k vaginálnímu použití.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pozor! Aby nedocházelo k připadnému znečištění spodního prádla a za účelem udržení hygieny je vhodné během léčby používat slipové vložky.

Nepoužívejte v případě poškození jakékoli části obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

## 7. Skladování

Výrobek skladujte v originálním obale při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

## 8. Balení

Balení obsahuje 5 globulí.

## 9. Výrobce

 FARMINA SP. Z O.O.  
UL. LIPSKA 44  
30-721 KRAKÓW  
POLSKO  
[www.apivaginal.com](http://www.apivaginal.com)

Datum poslední revize: 08.2020